

14枚入
保存に便利なチャック付き
(7枚×2袋)
7mm×10mm

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ここを押して開けてください。

第2類医薬品

ピーエスバンFRテープVa

上手な貼り方

[特長]

- ピーエスバンFRテープVaは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルビナクを1枚あたり35mg配合しています。
- ピーエスバンFRテープVaは柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれ節部にもよくフィットします。

⚠️ [使用上の注意]

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 潰瘍、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・はれ・ヒリヒリ感・かぶれ・水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]
腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

[用法・用量]
表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

[用法・用量に関する注意]

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を自安して半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。

[成分・分量] 體膏 100g中に次の成分を含んでいます。

フェルビナク	5.00g
I-メントール	4.20g
トコフェロール酢酸エステル	2.30g
グリチルレチチン酸	0.19g
添加物として軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリインブチレン、流動パラフィンを含有します。	

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえなさい。(誤用の原因になります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

(原寸大)